

定期予防接種一覧(乳幼児用) 平成 28 年 10 月 1 日改正

予防接種名	対象月齢・年齢	標準的接種月齢・年齢	基本的な接種間隔、回数	その他の接種間隔
ヒブ<不活化> (インフルエンザ菌b型) 予診票の色：若竹色	生後 2 か月 ~ 5 歳 に至るまで	生後 2 か月 ~ 7 か月 に至るまで	<p>【初回を生後 2 か月～7 か月に至るまでに開始した場合】 初回 3 回接種・追加 1 回接種</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————○————○-----○ 27 日以上 27 日以上 初回 3 回目終了後 7 か月以上</p> <p>※初回 3 回目までは 1 歳に至るまでに終了すること。</p> <p>【初回を生後 7 か月 1 日～1 歳に至るまでに開始した場合】 初回 2 回接種・追加 1 回接種</p> <p>初回 1 回目 2 回目 追加 ○————○-----○ 27 日以上 初回 2 回目終了後 7 か月以上</p> <p>※初回 2 回目までは 1 歳に至るまでに終了すること。</p> <p>【初回を 1 歳 1 日～5 歳に至るまでに開始した場合】 1 回接種</p>	<p>①初回接種 2 回目が 1 歳までに接種できなかった場合 初回 1 回接種・追加 1 回接種 (初回 2・3 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————×————×-----○ 初回 1 回目終了後 27 日以上</p> <p>②初回接種 3 回目が 1 歳までに接種できなかった場合 初回 2 回接種・追加 1 回接種 (初回 3 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————○————×-----○ 27 日以上 初回 2 回目終了後 27 日以上</p> <p>初回接種 2 回目が 1 歳までに接種できなかった場合 初回 1 回接種・追加 1 回接種 (初回 2 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 追加 ○————×-----○ 初回 1 回目終了後 27 日以上</p>
小児用肺炎球菌<不活化> 予診票の色：水色	生後 2 か月 ~ 5 歳 に至るまで	生後 2 か月 ~ 7 か月 に至るまで	<p>【生後 2 か月～7 か月に至るまでに開始した場合】 初回 3 回接種・追加 1 回接種</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————○————○-----○ 27 日以上 27 日以上 初回 3 回目終了後 60 日以上、1 歳すぎ</p> <p>※初回 3 回目までは 2 歳に至るまでに終了すること。</p> <p>【初回を生後 7 か月 1 日～1 歳に至るまでに開始した場合】 初回 2 回接種・追加 1 回接種</p> <p>初回 1 回目 2 回目 追加 ○————○-----○ 27 日以上 初回 2 回目終了後 60 日以上、1 歳すぎ</p> <p>※初回 2 回目までは 2 歳に至るまでに終了すること。</p> <p>【初回を 1 歳 1 日～2 歳に至るまでに開始した場合】 2 回接種</p> <p>1 回目 2 回目 ○————○ 60 日以上</p> <p>【初回を 2 歳 1 日～5 歳に至るまでに開始した場合】 1 回接種</p>	<p>①初回 2 回目を 2 歳に至るまでに接種できなかった場合 初回 1 回接種・追加 1 回接種 (初回 2・3 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————×————×-----○ 2 歳～5 歳に至るまで</p> <p>②初回 2 回目を 1 歳以降に接種した場合及び 初回 3 回目を 2 歳に至るまでに接種できなかった場合 初回 2 回接種・追加 1 回接種 (初回 3 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 3 回目 追加 ○————○————×-----○ 27 日以上 初回 2 回目終了後 60 日以上</p> <p>①初回 2 回目が 2 歳までに接種できなかった場合 初回 1 回接種・追加 1 回接種 (初回 2 回目は行わない)</p> <p>初回 1 回目 2 回目 追加 ○————×-----○ 初回 1 回目終了後 60 日以上</p>

予防接種名	対象月齢・年齢	標準的接種月齢・年齢	基本的な接種間隔、回数	その他の接種間隔
B型肝炎<不活化> 予診票の色：グレー地に桃色字	生後 1歳 に至るまで	2か月～9ヶ月 に至るまで	3回接種 1回目 ○ ————— 2回目 ○ ————— 3回目 ○ 27日以上 1回目より139日以上の間	B型肝炎ウイルスに感染している妊婦から生まれた新生児は感染する可能性が高いため、感染予防のためのワクチンを接種します。この場合、健康保険が適用されるため、定期接種は対象外となります。
四種混合<不活化> 〔ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ〕 予診票の色：ベージュ色	生後 3か月～7歳6か月 に至るまで	生後 3か月～1歳未満	初回3回接種・追加1回接種 初回1回目 ○ ————— 2回目 ○ ————— 3回目 ○ ----- 追加 ○ 20日以上 20日以上 初回3回目終了後6か月以上	
BCG <生> 予診票の色：青色	生後 1歳 に至るまで	生後 5か月～8か月未満	1回接種	
水痘<生> 予診票の色：白地に赤色枠	1歳～3歳 に至るまで	1回目 1歳～1歳3か月	2回接種 1回目 ○ ————— 2回目 ○ 3か月以上	① 2回目を3歳に至るまでに接種できなかった場合 1回接種 (2回目は行わない) 1回目 ○ ————— 2回目 ×
麻疹・風疹(MR)<生> 予診票の色：白茶色	I期 1歳～2歳 に至るまで	1歳～2歳 に至るまで	1回接種	
	II期 就学前年度の1年間	就学前年度の1年間	1回接種	
日本脳炎<不活化> 予診票の色：白地に藤色枠	I期 6か月～7歳6か月 に至るまで	3歳～5歳未満	初回2回接種・追加1回接種 初回1回目 ○ ————— 2回目 ○ ----- 追加 ○ 6日以上 初回2回目終了後6か月以上	

月齢・年齢の「至るまで」、「未満」は誕生日の前日まで接種することができます。

* 集団接種…BCG 市より接種日・接種会場のご案内を差し上げます。 * 個別接種…BCG以外の予防接種 指定医療機関へお問合せの上、接種してください。

予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチンを接種する場合に間隔を守ることが必要です。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔があるので、間違えないようにしてください。

<生ワクチン> 生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は、**27日以上**おく

【定期接種】…BCG、水痘、MR（麻しん・風しん） 【任意接種】…おたふくかぜ、ロタウイルスなど

<不活化ワクチン> 不活化ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は、**6日以上**おく

【定期接種】…ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌 【任意接種】…季節性インフルエンザなど

その他の定期接種（参考）

- ・日本脳炎2期 (1回接種) 対象年齢：9歳～13歳未満
- ・DT（ジフテリア・破傷風）2期 (1回接種) 対象年齢：11歳～13歳未満
- ・子宮頸がん (3回接種) 対象年齢：小学6年生（12歳となる年度）～高校1年生（16歳となる年度）の女子 * 現在積極的な接種の勧奨は行なっていません
- ・高齢者肺炎球菌 (1回接種) 対象年齢：65歳（平成30年まで経過措置あり）